



# JORNAL OFICIAL

**I SÉRIE – NÚMERO 115**  
**SEGUNDA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2014**

ÍNDICE:

## **SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE**

**Portaria n.º 68/2014:**

Aprova o novo Programa Regional de Vacinação, (PRV 2014). Revoga a Portaria n.º 5/2013, de 23 de janeiro.

**JORNAL OFICIAL****S.R. DA SAÚDE****Portaria n.º 68/2014 de 20 de Outubro de 2014**

O Programa Regional de Vacinação, atualmente em vigor na Região Autónoma dos Açores (RAA), foi aprovado pela Portaria n.º 5/2013, de 23 de janeiro.

Considerando o Programa Nacional de Vacinação (PNV), aprovado pelos Despachos n.ºs 17067/2011, de 21 de dezembro e 11961/2014, de 26 de setembro, do Ministério da Saúde, torna-se necessário alterar o Programa Regional de Vacinação de forma a conseguir-se maior uniformidade no acesso à vacinação.

Nestes termos e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 1.º do Decreto Legislativo Regional n.º 28/99/A, de 31 de julho, na redação dada pelos Decretos Legislativos Regionais n.ºs 2/2007/A, de 24 de janeiro e 1/2010/A, de 4 de janeiro e da alínea a) do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores manda o Governo Regional, pelo Secretário Regional da Saúde, o seguinte:

1- É aprovado o novo Programa Regional de Vacinação, adiante designado por PRV 2014, e o respetivo calendário de imunização, constante do Anexo I à presente Portaria e que dela faz parte integrante.

2 - O PRV 2014 é aplicável a todos os indivíduos presentes na Região com idade inferior a 18 anos (17 anos e 364 dias) e, durante toda a vida, para as vacinas contra o tétano e difteria (Td).

3 – A partir do dia 1 de outubro de 2014, a vacinação universal de rotina no âmbito do PRV 2014 com a vacina HPV, recomendada às raparigas com idades dos 10 aos 13 anos de idade inclusive, podendo coincidir com a administração da vacina contra o tétano e a difteria (Td).

4 – A vacinação contra HPV, no âmbito do PRV 2014, pode ser iniciada até aos 18 anos de idade exclusiva e completada (2ª ou 3ª dose) até aos 25 anos de idade inclusive.

5 - O esquema cronológico recomendado (Anexo II), a partir do dia 1 de outubro de 2014, para vacinação com vacina HPV é:

a) A vacinação com a vacina HPV deve ser iniciada entre os 10 e os 13 anos de idade inclusive: 2 doses (0, 6 meses).

6 - A partir do dia 1 de outubro de 2014, o PRV passa a incluir uma vacina contra a doença pneumocócica (Anexo I), aplicável às crianças até aos cinco anos de idade, participada de acordo com o previsto na Portaria n.º 52/2014, de 30 de julho.

7 - É revogada a Portaria n.º 5/2013, de 23 de janeiro.

8 - A presente portaria entra em vigor na data da sua assinatura.



Secretaria Regional da Saúde.

Assinada em 1 de outubro de 2014.

O Secretário Regional da Saúde, *Luís Mendes Cabral*.

## ANEXO I

### Programa Regional de Vacinação (PRV 2014)

#### Esquema recomendado

Vacina contra:	Idades												
	Nascimento	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	12 meses	15 meses	18 meses	5-6 anos	10-13 anos	Toda a vida 10/10 anos
Tuberculose	BCG												
Hepatite B	VHB 1	VHB 2				VHB 3							
Haemophilus		Hib 1		Hib 2		Hib 3				Hib 4			
Difteria -Tétano -		DTP <sub>a</sub> 1		DTP <sub>a</sub> 2		DTP <sub>a</sub> 3				DTP <sub>a</sub> 4	DTP <sub>a</sub> 5	Td	Td
Poliomielite		VIP 1		VIP 2		VIP 3					VIP 4		
Meningococo C								MenC 1					
Sarampo - Parotidite epidémica - Rubéola								VASPR 1			VASPR 2		
Infecções por vírus do papiloma humano (a)												HPV1 e 2 (a)	
Pneumocócica (VPn13) (b)		VPn 1		VPn 2		VPn 3				VPn 4			

(a) HPV: 2 doses (0, 6 meses), aplicável a partir de 1 de outubro de 2014.

(b) Aplicável a partir de 1 de outubro de 2014.

- Vacina comparticipada, de acordo com o previsto na Portaria nº 52/2014, de 30 de julho.
- A vacina polissacárida conjugada recomendada é a Prevenar13.



# JORNAL OFICIAL

## Idade de início de imunização entre 2-11 meses – Esquema recomendado

Idade de início	Primo-vacinação	Reforço (11-15 meses de idade)
2 – 6 meses	3 doses (Intervalo mínimo entre doses: 4 semanas)	1 dose (Intervalo mínimo desde a última dose: 8 semanas)
7 – 11 meses	2 doses (Intervalo mínimo entre doses: 4 semanas)	1 dose (Intervalo mínimo desde a última dose: 8 semanas)

## Idade de início de imunização ≥12 meses – Esquema recomendado

Idade de início	
12 – 23 meses	2 doses (Intervalo mínimo entre doses: 8 semanas)
≥24 meses	1 dose (se pertence a grupo de risco deverá fazer 2 doses; intervalo mínimo entre doses: 8 semanas)

- Esquemas cronológicos de recurso: recomenda-se que, sempre que o esquema de primo-vacinação não tenha sido completado, se adote o esquema de vacinação recomendado para a idade atual da criança (de acordo com os quadros anteriores).

## ANEXO II

### Esquemas cronológicos de transição e de recurso para a vacina HPV

Idade de início da vacinação	Estado Vacinal	Nº de doses recomendadas	Esquema recomendado	Intervalo mínimo entre as doses	
				1ª e 2ª	2ª e 3ª
10-13 <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> <sup>(c)</sup> (idade recomendada)	0 ou 1 dose	Fazer ou completar o esquema de 2 doses <sup>(c)</sup>	0, 6 meses	6 meses	-----
	2 doses com intervalo ≥6 meses	0 doses			
	2 doses com intervalo <6 meses	1 dose	0, 2, 6 meses	1 mês	3 meses
≥14 e <18 anos <sup>(d)</sup>	Qualquer	Fazer ou completar o esquema de 3 doses	0, 2, 6 meses ou 0, 1, 4 meses		



# JORNAL OFICIAL

---

- (a) Se a vacinação tiver sido iniciada antes dos 9 anos de idade, deve ser completado o esquema de 3 doses.
- (b) Se a vacinação tiver sido iniciada aos 9 anos de idade, deve ser completado o esquema de 2 doses.
- (c) Se a vacinação não foi completada até aos 13 anos de idade, deve ser completado o esquema de 2 doses até aos 25 anos de idade inclusive.
- (d) Se a vacinação não foi completada até aos 18 anos de idade, deve ser completado o esquema de 3 doses até aos 25 anos de idade inclusive.