

AVISOS AGRÍCOLAS

Circular n.º 1/2007

Ponta Delgada, 29 de Janeiro de 2007



Cítrinos

Sr. Agricultor, a **primeira rebentação do ano** dos citrinos está a verificar-se neste momento. Esta rebentação é muito importante, dado que sobre estes novos rebentos irá ocorrer a **floração** e a **frutificação**. Deste modo aconselha-se a realização de uma primeira fertilização, conforme a seguir se indica.

Figura 1 – Início da rebentação em citrinos

Fertilização

Durante o desenvolvimento de novos rebentos as necessidades de nutrientes são maiores. Por outro lado, nas plantas de citrinos em plena produção verificam-se normalmente três novas rebentações por ano, pelo que a adubação azotada deve ser fraccionada da seguinte forma:

1. **metade do azoto no início da primeira rebentação** (a adubação fosfatada e potássica deverá também ser feita neste momento, utilizando-se para tal um adubo composto ternário, NPK).
2. **a restante metade de azoto** deverá ser aplicada sob a forma de adubo azotado simples em **Agosto ou Setembro**. Em alternativa esta segunda metade poderá ainda ser aplicada em duas vezes, ou seja, um quarto em **Maio ou Junho** e o outro quarto em **Setembro**.

A quantidade de adubo a aplicar ao longo do ano depende dos resultados das análises de solo, do tipo de solo, das características da exploração, do tamanho e idade das plantas, e da quantidade de fruta produzida ou que se prevê produzir.



Figura 2 – Desenvolvimento da rebentação em citrinos

Para mais informações deve contactar:

Circular n.º 1/2007
26 de Janeiro

Direcção de Serviços de Agricultura e Pecuária
Laboratório Regional de Sanidade Vegetal
Quinta de S. Gonçalo – 9504-541 PONTA DELGADA
Tel. 296650270 – Fax 296650271